

نصائح وإجراءات فورية للمعرضات إلي الغاز المسيل للدموع

نتيجة لوجود حالات متكررة من النزيف المهبلي للنساء بعد تعرضهن للغاز المسيل للدموع، يرجى الأخذ في الاعتبار ما يلي:

هام للنساء الحوامل: يمكن أن يكون لقتابل الغاز المسيل للدموع آثار جانبية قد تؤدي إلى الإجهاض أو تشوه الأجنة.

1. هل من الممكن أن يحدث نزيف بعد التعرض للغاز المسيل للدموع؟

نعم، هناك أكثر من نوع للنزيف تم الإبلاغ عنه:

- نزيف يحدث في المعدة ويترتب عليه تقيء دم؛
- نزيف يحدث من الأنف؛
- نزيف مهبلي.

2. هل النزيف المهبلي دليل على مشكلة أكبر في الرحم؟

حتى الآن لا يوجد دليل على أن النزيف المهبلي الذي حدث لنساء تعرضن للغاز تسبب في مشاكل أخرى، والتفسير المتوفر في الوقت الراهن للنزيف هو أن يكون ناتج عن التوتر، والذي كثيراً ما يسبب نزيف مهبلي للعديد من النساء (شبيهاً بوقت الدورة الشهرية).

3. ما هي الإجراءات الفورية التي يجب إتباعها في حالة حدوث نزيف مهبلي بعد التعرض للغاز المسيل للدموع؟

ينصح بتناول الأدوية التالية لمدة ثلاثة أيام:

- دايسينون (Dicynone): 500 مليجرام (18 جنية العبوة)، قرص واحد، ثلاثة مرات في اليوم. في حالة توافره فقط 250 مليجرام (13 جنية العبوة) يؤخذ قرصين في المرة بدلاً من قرص واحد، ثلاثة مرات في اليوم، لنفس عدد الأيام.
 - دافلون (Daflon): 500 مليجرام (37 جنية العبوة)، قرص واحد، ثلاثة مرات في اليوم.
- في حالة عدم توقف النزيف بعد أخذ تلك الأدوية، ينصح بإجراء تحليل دم لمعرفة سبب النزيف ومراجعة طبيب متخصص للاستشارة والمتابعة.

يمكنكم الإبلاغ عن حالات مماثلة بالاتصال على الخط الساخن لنظرة للدرايات النسوية: 01011910917.